

## **Un programme de vaccination s'établit sur la base de critères :**

- Administratifs: Obligation faite à chaque voyageur en fonction des règles sanitaires du pays de destination.
- Risques réels : Situation sanitaire du pays visité

Conditions, saison et durée du séjour

Age du voyageur et son statut vaccinal

### **Pour tous et quelle que soit la destination**

Mise à jour des vaccinations incluses dans le calendrier vaccinal

- Tétanos
- Poliomyélite
- Diphtérie
- BCG

### **En fonction de la situation épidémiologique de la zone visitée :**

#### **FIEVRE JAUNE :**

Indispensable pour tout séjour dans une zone intertropicale d'Afrique, même en l'absence d'obligation administrative

- Déconseillée pendant la grossesse mais nécessaire si le voyage ne peut être reporté, en raison de la létalité élevée de la maladie
- Vaccin réservé aux centres agréés de vaccination (au moins 1 par département)
- Une injection au moins 10 jours avant le départ pour la primo-vaccination
- Validité 10 ans
- Donne lieu à la délivrance d'un carnet international de vaccination

## **MENINGITE à MENINGOCOQUE :**

### **3 vaccins sont actuellement disponibles en France :**

- Vaccin conjugué contre le méningocoque de sérotype C
- Vaccin contre les méningocoques des sérotypes A et C
- Vaccin tétravalent des sérotypes A,C,Y,W135 réservé aux centres agréés
  - La vaccination contre les infections invasives à méningocoques est recommandée pour les zones d'endémie et en particulier pour la ceinture de la méningite en Afrique (Sénégal et Mali entre autres)
  - Le vaccin contre les méningocoques des sérotypes A et C est recommandé

L'actualité des épidémies de méningite peut être consultée sur le site de l'OMS

<http://www.who.int/csr/don>

## **En fonction des conditions et de la durée du séjour :**

### **HEPATITE A :**

Quand l'hygiène est précaire et tout particulièrement pour tout voyageur porteur d'une maladie chronique du foie.

Une injection avant le départ, rappel 6 à 12 mois plus tard

Durée de protection 10 ans

Examen sérologique préalable (recherche d'IgG) = intérêt pour les personnes ayant des antécédents d'ictère, ou ayant vécu en zone d'endémie, ou nées avant 1945.

### **TYPHOÏDE :**

Pour des séjours prolongés dans des pays où l'hygiène est précaire

Une injection 15 jours avant le départ

Durée de protection 3 ans

### **HEPATITE B :**

Les professionnels de santé doivent être à jour de leur calendrier vaccinal.

Cette vaccination est recommandée dans les pays à forte prévalence.

Deux injections espacées d'un mois, rappel unique 6 mois plus tard.

Possibilité de protocole accéléré en cas de départ rapide (voir le résumé des caractéristiques du produit).

### **CHOLERA :**

Nouveau vaccin per os disponible dans les centres de vaccinations internationales.

Sa prescription n'est pas justifiée pour les voyageurs chez qui le respect des mesures d'hygiène reste la meilleure des préventions (hygiène alimentaire, lavage des mains).

### **RAGE A TITRE PREVENTIF :**

En Afrique, le vaccin contre la rage ne fait pas partie des vaccins recommandés, bien que celle-ci sévisse.

Il convient d'éviter tout contact avec les animaux

3 injections à J0, J7, J21 ou J28 et rappel 1 an après

Durée de protection 5 ans

**La vaccination préventive ne dispense pas d'un traitement curatif qui doit être mis en œuvre le plus tôt possible en cas d'exposition avérée ou suspectée.**